

MEVSİMLİK BAKIMLAR

İLKBAHAR BAKIM VE BESLEMESİ



Arıcının en önemli işlerinden biridir. İlkbaharda arı aileleri ister kuvvetli ister zayıf olsun teşvik beslemesi mutlaka yapılmalıdır. Amaç bal sezonuna güçlü kolonilerle girmektir.

Teşvik beslemesi; Çiğdem, Badem, Erik veya Kayısı çiçek açınca başlar, iğde çiçek açınca biter.

Teşvik beslemesinde ilk 10 gün için gün aşırı, sonraki iki hafta ise 3-5 gün ara ile şurup verilmelidir.

Ayrıca yavru büyütmede ihtiyaç duyulan protein; polen, kek veya polenli ballı çerçeve verilerek karşılanmalıdır.



Arılara verilecek Şurubun sıcaklığı 25°C nin altında olmalıdır.

Kolonilere akşam saatlerinde ve günlük tüketebilecekleri kadar şurup verilmelidir.

Kolonilerin yapay beslenmesinde kullanılacak

Kek ve şurup formülleri şurup Karışımları

Katı şurup:

2 kg Çeker + 1 lt su (eken ilkbahar ve geç sonbaharda verilecek)

Normal şurup:

1 kg Çeker + 1 kg su (geç ilkbahar ve erken sonbaharda verilecek)

Sıvı şurup:

1 lt su + 0,5 kg Çeker (bölme, birleştirme ve oğul alınırken verilir)

Kek Karışımları:

3 kg bal + 1 kg polen + 6 kg pudra Şekeri

3 kg bal + 1 kg yağsız süt tozu + 6 kg pudra şekeri



SONBAHAR BAKIMI VE KIŞLATMA

Sonbahar bakımı ve kışlatma bal sezonuna güçlü kolonilerle girebilmenin en önemli ayağıdır.

Sonbahar bakımı bal hasadında hemen sonra başlar ve suyun donmasıyla biter.



Suyun donması kışın başlangıcıdır. Arılar kışa girmeden önce arı mevcudu, bal ve ana arı kontrolünün yapılarak varsa eksiklerin giderilmesi gerekir.

Kovanlarda kışa girerken en az 5-6 çerçeveden az koloni ile girilmesi ciddi bir risktir.

Bu nedenle kışa en az 6 en fazla 9 çerçeveli koloniler ile girilmelidir.

Kışlatmaya alınacak kolonideki mevcut çerçeve sayısının en az yarısını saracak kadar sinek (ergin arı) ve çerçeve sayısının 2 katı kadar kg bal bulunmalıdır.



Örneğin 6 çerçeveli bir koloni ile kışlatma yapılacaksa 6:2=3 çerçeveyi basacak kadar Ergin arı, 6X2=12 kg bal bulundurulmalıdır.

Ayrıca kolonilerin durumuna göre 1-2 kg polenli kek verilmesi kışın daha garantili geçmesi demektir.



Kışlatma yerinde rutubet olmaması ve ısının en az 6-8 derece civarında olması gerekir.

Zayıf koloniler birleştirilmeli vasat ama kışı geçirebilecek koloniler bölme tahtası yardımıyla daraltılmalıdır.

Boş alanlar gazete kâğıtları ile iyice doldurulmalı örtü bezleri kuvvetli ve düzenli bir şekilde örtülmelidir. Kovanın örtü bezi pamuklu olmalı ve kovan kapağının dışına taşmamalıdır. Uçuş deliği daraltılmalı,



Kışlatmada kovanlar yerden 25-30 cm yüksekte kuzeyi kapalı ve hakim rüzgarları olmayacak şekilde yerleştirilmelidir.

Kovanlar yan yana birbirine değmeyecek şekilde dizilmeli ve üstleri yağmur ve kardan korunmalıdır.

Kışlatmaya alınmış kovanlar kesinlikle yerinden oynatılmamalıdır.

Adres	Yeni Mahalle Cizre Caddesi Merkez/ŞIRNAK
Santral	0 486 216 2085
Fax	0 486 216 2084
e-mail	sirnak@tarimorman.gov.tr
web	http://sirnak.tarim.orman.gov.tr

T.C.
ŞIRNAK VALİLİĞİ
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü



Arılarda Sonbahar Bakımı ve Kışlatma



Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su
Ürünleri şube Müdürlüğü
2019